


ВІД ВПЛ



Захисти мене!  
Захисти інших!



Захисти нас!

Де можуть вакцинувати мою дитину проти ВПЛ?

У всіх уповноважених фахівців, таких як педіатр, гінеколог, уролог та сімейний лікар. Додаткова інформація про вакцинацію проти ВПЛ: [www.impfen-info.de](http://www.impfen-info.de)

Скільки коштує вакцинація проти ВПЛ?

До 18 років витрати покриваються всіма державними та більшістю приватними касами лікарняного страхування. **BAHN-BKK** покриває витрати на щеплення від ВПЛ до 19 років.



Хочете дізнатися більше?  
Відвідайте наш Youtube-канал!



Медичне товариство сприяння здоров'ю (ÄGGF) вже понад 65 років займається в німецьких школах питаннями зміцнення здоров'я підлітків та їх оточення. Його лікарі надають науково-обґрунтовану та достовірну інформацію, в тому числі з питань та сумнівів стосовно інтимного здоров'я, щеплень та профілактичних оглядів. Під гаслом: „Вчитися пізнавати, цінувати та захищати власне тіло з його здібностями та потребами“ товариство інформує відповідно до віку та розвитку дітей. Його інформаційно-просвітницька, культурно-чутлива та багаторазово успішно оцінена профілактична концепція навчання в галузі здоров'я для всіх типів шкіл є неповторною в Німеччині і вже була неодноразово нагороджена. Додаткова інформація: [www.aeggf.de](http://www.aeggf.de)

**BAHN-BKK** – нараховуючи більше ніж 680.000 клієнтів, являється однією з найбільших корпоративних медичних страхових компаній Німеччини. Як загальнонаціональна відкрита каса лікарняного страхування з акцентом на профілактичні заходи, вона працює постійно над подальшим розширенням своїх послуг та адаптацією їх до потреб клієнтів. Надійна, інноваційна та завжди на крок попереду, вона є касою лікарняного страхування як для бізнес-клієнтів у галузі транспорту та логістики, так і для приватних клієнтів, і пропонує індивідуальні додаткові послуги. Завдяки ЕКСТРА-послугам, що не входять в спектр передбачених законодавством стандартних страхових послуг, **BAHN-BKK** пропонує винятково атрактивний сервіс для всіх своїх Клієнтів. Додаткова інформація: [www.bahn-bkk.de](http://www.bahn-bkk.de)

Spi:Ke фінансується за рахунок



BAHN BKK

© Медичне товариство сприяння здоров'ю (ÄGGF) Весь зміст, тексти і графіка захищені авторським правом. Текст: ÄGGF, дизайн та ілюстрації: Елізабет Ноель. Стан: січень 2022

Надійно вакцинований від ВПЛ

**Spi:Ke**

Сексуальність,  
статеве дозрівання,  
вакцинація:  
знай своє тіло!

Все, що необхідно знати про щеплення від ВПЛ батькам, опікунам та вчителям



BAHN BKK

Надійно вакцинований



Захисти мене!  
Захисти інших!




Захисти нас!

## ВПЛ як на долоні

Понад 200 типів ВПЛ являються поширеними збудниками хвороб у всьому світі.

40 з них передаються статевим шляхом через контакт зі шкірою та слизовими оболонками. Вони являються одними з найпоширеніших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

15 з них є типами високого ризику, які можуть викликати рак та передракові захворювання, та 25 є типами низького ризику, що викликають генітальні бородавки (конділоми).




**~80%** 80 % сексуально активних людей інфікуються один або більше разів протягом життя принаймі одним з цих типів ВПЛ - багато хто з них вже під час першого сексуального контакту.

**~10%** 10 % не можуть успішно побороти інфекцію. В такому випадку існує високий ризик виникнення передракових та ракових захворювань в анальній / генітальній області та області рота / горла, а також висококонтагіозних генітальних бородавок.

У всьому світі майже кожне 20-те онкологічне захворювання зумовлене інфікуванням ВПЛ.

## Які захворювання можуть виникнути після інфікування ВПЛ?

Щороку 6.250 жінкам та 1.600 чоловікам діагностують рак, пов'язаний з ВПЛ, і ще десяткам тисяч - передракові захворювання. Понад 100.000 тисяч людей потерпають від генітальних бородавок.



Презервативи не забезпечують надійного захисту від вірусів НР. А своєчасна вакцинація проти ВПЛ забезпечує!




## Вакцинація - це найкращий самозахист!

Заява Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): „Окрім здорової питної води, жоден захід не врятував стільки життів, як вакцинація“.

## Захистити свою дитину та інших

Тільки, якщо достатня кількість людей має імунітет проти ВПЛ, наприклад, за допомогою щеплення проти ВПЛ, будуть захищені також ті, хто не може бути вакцинований, наприклад, люди з імунодефіцитом або вагітні жінки.


● невакцинований, (поки що) здоровий ● вакцинований, здоровий ● інфікований або хворий і, через це заразний для інших



## Що роблять інші країни?


Завдяки програмам вакцинації в школах та / або додаткової вакцинації хлопчиків в таких країнах як Англія, Австралія, Канада або Норвегія, вже давно досягнуто вищого рівня вакцинації, і таким чином, успішно знижено рівень захворювань, пов'язаних з ВПЛ.

## Кому, коли і як часто робити щеплення від ВПЛ?



### ВСІМ ВІД 9 до 17!


В ідеальному варіанті до першого статевого контакту. Але і після нього щеплення залишається ефективним та важливим.



### у віці від 9 до 14 років

рекомендований вік вакцинації

2 дози щеплення з інтервалом 0 - 5 місяців




звичайний графік вакцинації

### у віці від 15 до 17 років\*

у разі потреби з 18 років\*\*

3 дози щеплення з інтервалом 0 - 2 - 6 місяців



звичайний графік вакцинації

\* Вакцинація у більш пізньому віці також можлива (так звана надолужуюча вакцинація). Витрати на щеплення покриваються всіма державними касами лікарняного страхування до 18 років.

\*\* Покриття витрат касами лікарняного страхування, як правило, є індивідуальним рішенням.

До 14 років Вашій дитині потрібна Ваша згода на вакцинацію. Далі все залежить від її індивідуальної здатності розуміти та приймати рішення. Як правило, це з 16 років. Ревакцинація наразі не рекомендується.

## Від чого захищає вакцина проти ВПЛ?

Нині доступні 2 вакцини.

9-валентна вакцина

Захисна дія проти раку та передракових захворювань, пов'язаних з ВПЛ доброякісних, але тривалих в лікуванні і обтяжливих генітальних бородавок - 90 %

~90%


Двовалентна вакцина

Захисна дія тільки проти раку та передракових захворювань, пов'язаних з ВПЛ 70 %

~70%

В залежності від вакцини залишається залишковий ризик захворювань, пов'язаних з ВПЛ, у межах 10 - 30 %. Тому навіть вакциновані жінки старше 20 років повинні регулярно проходити обстеження для раннього виявлення раку у гінеколога.

## Вакцинація проти ВПЛ для всіх підлітків



## Наскільки безпечна вакцина проти ВПЛ?

Близько 300 мільйонів доз вакцин було введено з 2007 року. Щорічні звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підтверджують дуже високу безпеку, добру переносимість та довготривалу ефективність вакцинації проти ВПЛ. Додаткова інформація: [www.who.int](http://www.who.int) та [www.pei.de](http://www.pei.de)

## Які побічні ефекти можуть виникнути?

Вакцини проти ВПЛ, як правило, добре переносяться. Як і інші вакцини, вакцина проти ВПЛ може викликати тимчасові реакції на щеплення. До них належать біль, припухлість і почервоніння в місці щеплення, головний біль, запаморочення, підвищення температури, втома і слабкість. Згідно з даними інституту Роберта Коха, за винятком поодиноких випадків, не було зареєстровано жодних тривалих побічних ефектів або несприятливих наслідків для здоров'я з моменту виходу на ринок у 2007 році. Додаткова інформація: [www.rki.de](http://www.rki.de)


# Надійно вакцинований від ВПЛ




**Захисти мене!  
Захисти інших!**



**Захисти мене!  
Захисти інших!**



**Захисти нас!**



**Захисти нас!**

